DITCH CUTTINGS Depth in metres	G'ina indet	Orb. universa	G'ina decoraperta	G'ina bulloides	G'alia miozea conoidea	G'alia acostaensis	G'quad dehiscens (S.S.)	G'alia miotumida	G'alia mayeri (S.S.)	Praeorb. glomerosa	G'oides bispherícus	G'oides trilobus	G'ina woodi woodi	G'alia continuosa	G'alia conica	G'alia praemenardii	G'alia praescitula	G'quad altispira	Orb. suturalis	G'alia miozea miozea	G'alia siakensis/mayeri	G'ina & G'alia indet (<.2mm)	G'ina ciperoensis	G'alia bella	G'alia peripheronda	G'oides rubra	G'alia zealandica (S.S.)	G'ina woodi connecta	Ss. disjuncta	G'quad advena	G'oides parawoodi	Cat. dissimilis	Ss. seminulina	G'quad dehiscens (S.L.)	G'alia zealandica incognita	G'ina angiporoides angiporoides	G'ina euapertura	G'quad tripartita	G'ina praebulloides	G'ina angiporoides (S.S.)	G'ina brevis	G'ina angiporoides minima	G'ina linaperta	G'ina ampliapertura Gp.	G'alia nana	G'alia cerroazulensis (S.L.)	G'alia turgida	G'theka barri	G'theka index
220.0→	}	No planktonics																																																
350.0→																																																		
450.0→	°																																																	
650.0→		°	x	x	°	°																																												
810.0→	x																																																	
1000.0→		x	x	x																																														
1200.0→		D	x	x	°		°	°																																										
1300.0→		x	x	x	°			°	x																																									
1400.0→		x	x	x	x				x	°	°	x	x	x	x	°	°																																
1480.0→		x	x	x	°				x			x	x	x	°	°	°	°																																
1550.0→		x					°			°	°	x	x	x	°	°	°		°	°	x																													
1650.0→																						D																													
1710.0→		x		x						°	°	x	x		°		°		x		x																													
1800.0→		°		x			x			°		x	x	x	x	x	°		°	°	x			x	°	x																								
1915.0→		°		x						°		x	x	x	x		°		°	°	x			x	°	°	°	x																						
1950.0→							x			°		x	x	x	x		°	x			x				°	°	°	x	°	x		°																		
2000.0→				x									x	x	x														x	x			x																	
2050.0→							x				°		x	x	x			x											x	x	°	x	x	°																
2100.0→							x				°		°	x	x			x											x	x		x	°																	
2150.0→							x						x	x	x							°							°	x			x	°	°															
2175.0→							°							x																x			°	°																
2185.0→							°						°	x	x			x												x			x	°																
2195.0→							°						x	x	x														°	x			x	°																
2200.0→		°					x							x	x		°	x						°				x	x			x																		
2224.0→							x							x	x							D		°				°	x			x	°			x	x													
2236.0→														x	x							D						°	x							°	x													
2251.0→														x	x							D							x					°			x			x										
2260.0→														x	x					°		D	°						x		°					x	x													
2266.0→																																					°	x	x	x										
2275.0→																																							°	x	x	°								
2287.0→																																							°	x	°	x								
2302.0→														°															°											x									
2317.0→		°																			°																		°	°	°	°							
2329.0→		°																																					°		°	°							
2338.0→										?									°																		°				°								
2344.0→	N.F.F.																																																	
2371.0→																	°																																	
2401.0→		x																																°			°	°	°	°	°	°	°	°	°	°				
2455.0→																																										°	x	x	°	°	°	°	°	
2503.0→																																											°			°			°	
2569.0→																																							x	x	°		°	°	x		°		°	
2656.0→																																										°								

SYMBOLS ° = <20 specimens
x = >20 specimens

D = Dominant >60% specimens
N.F.F. = no foraminifera found

DEPT. NAT. RES & ENV
PE906189

TABLE 4: FACTUAL DATA of PLANKTONIC FORAMINIFERAL DISTRIBUTION - OMEO # 1.

(refer Table 2 for Interpreted Biostratigraphy).

David Taylor, April 28,1983.